

Introducción a la Teoría de Números
Curso 2012

Lista 2. Congruencias – entrega 14/9

1. Mostrar que si a y b son enteros y p es un primo, entonces

$$(a + b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}.$$

2. Encontrar cuatro sistemas completos de restos módulo 7 cuyos elementos satisfagan (1) ser no negativos, (2) ser impares, (3) ser pares, (4) ser primos.
3. Encontrar criterios para la divisibilidad de un entero por 5, 9 y 11, y demostrar cada uno de estos criterios.
4. * (De la competencia Putnam 1988). Se define una secuencia de enteros decimales de la siguiente forma: $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, y a_{n+2} se obtiene escribiendo los dígitos de a_{n+1} seguidos inmediatamente por los de a_n . Por ejemplo $a_3 = 10$, $a_4 = 101$, y $a_5 = 10110$. Se quiere determinar los n tales que a_n es múltiplo de 11 de la siguiente forma:
- (a) Encontrar el menor $n > 1$ tal que a_n es divisible entre 11.
- (b) Probar que a_n es divisible entre 11 si y sólo si $n \equiv 1 \pmod{6}$.
5. Encontrar un entero x tal que $37x \equiv 1 \pmod{101}$.
6. ¿Cuál es el orden de 2 módulo 17?
7. Sea p un primo. Probar que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un cuerpo.
8. Probar que si $n > 4$ es compuesto entonces $(n - 1)! \equiv 0 \pmod{n}$.
9. ¿Para qué valores de n es $\varphi(n)$ impar?
10. Siete estudiantes de matemática tratan de compartir una gran cantidad de libros de matemática equitativamente. Desafortunadamente, sobran seis libros, y en la pelea uno de los estudiantes es expulsado. Los restantes seis estudiantes todavía son incapaces de repartir los libros ya que sobran dos, nuevamente pelean, y otro es expulsado. Cuando los restantes cinco reparten los libros, sobra uno, y es solamente después de expulsar otro estudiante que logran repartir equitativamente los libros. ¿Cuál es el mínimo número de libros que hace esto posible?
11. Encontrar las cuatro soluciones a la ecuación
- $$x^2 - 1 \equiv 0 \pmod{35}$$
12. Usar la fórmula para $\varphi(n)$ para dar una demostración de que hay infinitos primos. [Sugerencia: si p_1, p_2, \dots, p_t fueran todos los primos, entonces $\varphi(p_1 p_2 \cdots p_t) = 1$].
13. * Probar que hay una raíz primitiva módulo p^2 , donde p es primo.
14. * Si p es un primo impar, probar que existe una raíz primitiva módulo p^n .
15. Encontrar una raíz primitiva módulo 125.
16. * Caracterizar aquellos enteros n tales que existe una raíz primitiva módulo n (en términos de su factorización).