

PRÁCTICO 2: MEDIDA DE LEBESGUE EN $\mathbb{R}^d$

Varios de los ejercicios están tomados del libro [RA]: “Real Analysis” de Stein y Shakarchi. Se sugiere consultarlo, dado que el libro contiene sugerencias y ejercicios relacionados que pueden ser de ayuda. Otros ejercicios tienen pre-requisitos de Topología, se indican con una [T].

1. Supongamos que $E_1, E_2, \dots$ son conjuntos medibles de $\mathbb{R}^d$. Entonces
 - (i) Si $E_k \nearrow E$, entonces $m(E) = \lim_{N \rightarrow \infty} m(E_N)$
 - (ii) Si $E_k \searrow E$ y $m(E_k) < \infty$ para algún k , entonces $m(E) = \lim_{N \rightarrow \infty} m(E_N)$
 - (iii) Dar un contraejemplo para (ii) en el que $m(E_k) = \infty$ para todo k .

Observación: Este ejercicio es el Corolario 3.3 del capítulo 1 de [RA].

2. (Ejercicio 5 de [RA]) Dado un conjunto E , definimos $\mathcal{O}_n$ mediante

$$\mathcal{O}_n = \{x: d(x, E) < 1/n\}.$$

Demostrar

- (a) Si E es compacto $m(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(\mathcal{O}_n)$.
 - (b) Dar contraejemplos cuando E es cerrado y no acotado, y cuando es abierto y acotado.
3. Propiedades de invarianza de la medida de Lebesgue

Dados el conjunto medible $E \subset \mathbb{R}^d$, $h \in \mathbb{R}^d$ y $\delta > 0$ definimos $E_h = E + h = \{x + h: x \in E\}$ el conjunto trasladado de E por h y $\delta E = \{\delta x: x \in E\}$ el conjunto dilatado de E un factor δ . Demostrar que E_h y δE son conjuntos medibles y que:

- (i) $m(E_h) = m(E)$.
- (ii) $m(\delta E) = \delta^d m(E)$.
- (iii) Si B es una bola de radio r en $\mathbb{R}^d$, entonces $m(B) = r^d m(B_1)$, donde B_1 es la bola de centro en el origen y radio unitario (Ejercicio 6 de [RA]).

Demostrar además que $m(-E) = m(E)$ si $-E = \{-x: x \in E\}$.

Observación: Ver página 22 de [RA].

4. (Ejercicio 7 de [RA]) Si $\delta = (\delta_1, \dots, \delta_d)$ es un vector de coordenadas positivas $\delta_i > 0$ ($i = 1, \dots, d$) definimos ahora

$$\delta E = \{(\delta_1 x_1, \dots, \delta_d x_d): (x_1, \dots, x_d) \in E\}.$$

Demostrar $m(\delta E) = \delta_1 \cdots \delta_d m(E)$.

5. (Ejercicio 8 de [RA]) Sea L una transformación lineal de $\mathbb{R}^d$ en $\mathbb{R}^d$. Demostrar que si $E \subset \mathbb{R}^d$ es medible, también lo es $L(E)$, utilizando el siguiente procedimiento:

- (a) Notar que si E es compacto también lo es $L(E)$. Luego si E es un conjunto F_σ también lo es $L(E)$.
 (b) Como L verifica

$$|L(x) - L(y)| \leq M|x - y|,$$

para algún $M > 0$, podemos ver que la imagen por L de un cubo de lado ℓ esta contenida en un cubo de lado $c_d M \ell$, con $c_d = 2\sqrt{d}$. De all, si $m(E) = 0$ entonces $m(L(E)) = 0$. Finalmente, aplicar el Corolario 3.5.

6. (Ejercicio 9 de [RA]) Construir un conjunto abierto $U \subset [0, 1]$ tal que $m(\partial \bar{U}) > 0$. Construir un ejemplo análogo en el plano.

7. [T] Un subconjunto de un espacio topológico se dice residual si contiene una intersección numerable de abiertos densos, y magro si está contenido en una unión numerable de cerrados con interior vacío. Un espacio de Baire es un espacio topológico que no se puede escribir como unión numerable de cerrados con interior vacío, y el teorema de Baire asegura que todo espacio métrico completo tiene esta propiedad. En un espacio de Baire, un conjunto residual es todo desde el punto de vista topológico, mientras que un magro es un conjunto pequeño. Sin embargo, desde el punto de vista de la medida estas nociones pueden diferir. (i) Construir un ejemplo de un conjunto magro en $[0, 1]$ con medida positiva. (ii) Construir un ejemplo de un conjunto residual en $[0, 1]$ con medida cero. Sugerencia: Observar que en el repartido 1 construimos un conjunto magro (un conjunto de Cantor) con medida positiva. Considerar una sucesión creciente de conjuntos de Cantor de medida adecuada.

8. **Lema de Borel-Cantelli** (Ejercicio 16 de [RA])

Sea $\{E_k\}_{k=1}^\infty$ una familia numerable de subconjuntos medibles de $\mathbb{R}^d$ tal que $\sum_{k=1}^\infty m(E_k) < \infty$. Sea

$$E = \limsup_{k \rightarrow \infty} (E_k) = \bigcap_{n=1}^\infty \bigcup_{k \geq n} E_k = \{x \in \mathbb{R}^d : x \in E_k \text{ para infinitos } k\}.$$

Probar que E es medible y que $m(E) = 0$.

9. ([T]) Sea $\mathcal{B}_{[0,1]}$ la σ -álgebra de Borel y $\mathcal{L}_{[0,1]}$ la familia de los conjuntos medibles (que también forman una σ -álgebra). Sabemos que todo boreliano es medible, o sea $\mathcal{B}_{[0,1]} \subset \mathcal{L}_{[0,1]}$. Probaremos que esta inclusión es estricta.¹

Sean $C_1, C_2 \subset [0, 1]$ dos conjuntos de Cantor tales que $m(C_1) = 0$ y $m(C_2) > 0$, y sea $h : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ un homeomorfismo tal que $h(C_1) = C_2$. Sea $N \subset C_1$ un conjunto no medible y $X = h^{-1}(N)$. Probar que X es medible y no es un boreliano.

¹Sabemos que todo conjunto de medida exterior nula es medible, y eso implica que todo subconjunto de un conjunto de medida cero es medible. Como existen conjuntos medibles no numerables (p.ej. el conjunto de Cantor) entonces $\#\mathcal{L}_{[0,1]} = \#\mathcal{P}(\mathbb{R})$. Se puede probar que $\#\mathcal{B}_{[0,1]} = \#\mathbb{R}$ y esto da otra demostración de que la inclusión es estricta. Ver libro de Folland, pág 39.