

Álgebras de Operadores

Fernando Abadie

Centro de Matemática-FC
Universidad de la República-Uruguay

1 Orígenes. Objetivo.

1 Orígenes. Objetivo.

2 Álgebras de Banach

1 Orígenes. Objetivo.

2 Álgebras de Banach

3 Teoría espectral

- 1 1932: John von Neumann y la mecánica cuántica.

Orígenes. Objetivo.

- 1 1932: John von Neumann y la mecánica cuántica.
- 2 Década de 1930: trabajos de F. Murray y J. von Neumann. Interés: representaciones de grupos y mecánica cuántica.

Orígenes. Objetivo.

- 1 1932: John von Neumann y la mecánica cuántica.
- 2 Década de 1930: trabajos de F. Murray y J. von Neumann. Interés: representaciones de grupos y mecánica cuántica.
- 3 Fines de los años 30: Israel Gelfand y las álgebras de Banach.

Orígenes. Objetivo.

- 1 1932: John von Neumann y la mecánica cuántica.
- 2 Década de 1930: trabajos de F. Murray y J. von Neumann. Interés: representaciones de grupos y mecánica cuántica.
- 3 Fines de los años 30: Israel Gelfand y las álgebras de Banach.
- 4 1943: teoremas de Gelfand-Naimark.

Orígenes. Objetivo.

- 1 1932: John von Neumann y la mecánica cuántica.
- 2 Década de 1930: trabajos de F. Murray y J. von Neumann. Interés: representaciones de grupos y mecánica cuántica.
- 3 Fines de los años 30: Israel Gelfand y las álgebras de Banach.
- 4 1943: teoremas de Gelfand-Naimark.
- 5 Desarrollos posteriores.

Orígenes. Objetivo.

- 1 1932: John von Neumann y la mecánica cuántica.
- 2 Década de 1930: trabajos de F. Murray y J. von Neumann. Interés: representaciones de grupos y mecánica cuántica.
- 3 Fines de los años 30: Israel Gelfand y las álgebras de Banach.
- 4 1943: teoremas de Gelfand-Naimark.
- 5 Desarrollos posteriores.

Orígenes. Objetivo.

- 1 1932: John von Neumann y la mecánica cuántica.
- 2 Década de 1930: trabajos de F. Murray y J. von Neumann. Interés: representaciones de grupos y mecánica cuántica.
- 3 Fines de los años 30: Israel Gelfand y las álgebras de Banach.
- 4 1943: teoremas de Gelfand-Naimark.
- 5 Desarrollos posteriores.

Objetivos:

Orígenes. Objetivo.

- 1 1932: John von Neumann y la mecánica cuántica.
- 2 Década de 1930: trabajos de F. Murray y J. von Neumann. Interés: representaciones de grupos y mecánica cuántica.
- 3 Fines de los años 30: Israel Gelfand y las álgebras de Banach.
- 4 1943: teoremas de Gelfand-Naimark.
- 5 Desarrollos posteriores.

Objetivos:

- 1 Hacer una introducción básica a las álgebras de Banach.

Orígenes. Objetivo.

- 1 1932: John von Neumann y la mecánica cuántica.
- 2 Década de 1930: trabajos de F. Murray y J. von Neumann. Interés: representaciones de grupos y mecánica cuántica.
- 3 Fines de los años 30: Israel Gelfand y las álgebras de Banach.
- 4 1943: teoremas de Gelfand-Naimark.
- 5 Desarrollos posteriores.

Objetivos:

- 1 Hacer una introducción básica a las álgebras de Banach.
- 2 Presentar los teoremas de Gelfand-Naimark y la teoría de representaciones para C^* -álgebras.

Orígenes. Objetivo.

- 1 1932: John von Neumann y la mecánica cuántica.
- 2 Década de 1930: trabajos de F. Murray y J. von Neumann. Interés: representaciones de grupos y mecánica cuántica.
- 3 Fines de los años 30: Israel Gelfand y las álgebras de Banach.
- 4 1943: teoremas de Gelfand-Naimark.
- 5 Desarrollos posteriores.

Objetivos:

- 1 Hacer una introducción básica a las álgebras de Banach.
- 2 Presentar los teoremas de Gelfand-Naimark y la teoría de representaciones para C^* -álgebras.
- 3 Presentar y estudiar algunos ejemplos relevantes.

Definición

Un álgebra normada A es un espacio normado sobre $\mathbb{C}$ que es al mismo tiempo un anillo para el cual la multiplicación es $\mathbb{C}$ -bilineal y satisface:

$$\|ab\| \leq \|a\| \|b\|, \forall a, b \in A.$$

Definición

Un álgebra normada A es un espacio normado sobre $\mathbb{C}$ que es al mismo tiempo un anillo para el cual la multiplicación es $\mathbb{C}$ -bilineal y satisface:

$$\|ab\| \leq \|a\| \|b\|, \forall a, b \in A.$$

- 1 Si A tiene unidad 1 se exige $\|1\| = 1$

Definición

Un álgebra normada A es un espacio normado sobre $\mathbb{C}$ que es al mismo tiempo un anillo para el cual la multiplicación es $\mathbb{C}$ -bilineal y satisface:
 $\|ab\| \leq \|a\| \|b\|, \forall a, b \in A.$

- ❶ *Si A tiene unidad 1 se exige $\|1\| = 1$*
- ❷ *Si A es completa se dice que A es un álgebra de Banach.*

Definición

Un álgebra normada A es un espacio normado sobre $\mathbb{C}$ que es al mismo tiempo un anillo para el cual la multiplicación es $\mathbb{C}$ -bilineal y satisface:
 $\|ab\| \leq \|a\| \|b\|, \forall a, b \in A.$

- ❶ *Si A tiene unidad 1 se exige $\|1\| = 1$*
- ❷ *Si A es completa se dice que A es un álgebra de Banach.*
- ❸ *Si A tiene una involución $*$ tal que $\|a^*\| = \|a\| \forall a \in A$, se dice que A es una $*$ -álgebra normada (de Banach si es completa).*

Definición

Un álgebra normada A es un espacio normado sobre $\mathbb{C}$ que es al mismo tiempo un anillo para el cual la multiplicación es $\mathbb{C}$ -bilineal y satisface:
 $\|ab\| \leq \|a\| \|b\|, \forall a, b \in A.$

- 1 Si A tiene unidad 1 se exige $\|1\| = 1$
- 2 Si A es completa se dice que A es un álgebra de Banach.
- 3 Si A tiene una involución $*$ tal que $\|a^*\| = \|a\| \forall a \in A$, se dice que A es una $*$ -álgebra normada (de Banach si es completa).
- 4 Una $*$ -álgebra de Banach es una C^* -álgebra si satisface la “ C^* -condición”:

$$\|a^*a\| = \|a\|^2, \forall a \in A \quad (1)$$

Ejemplos

Ejemplos

Ejemplos

- 1 Si H es un espacio de Hilbert, entonces $B(H)$ es una C^* -álgebra. En particular M_n : es una C^* -álgebra.

Ejemplos

- 1 Si H es un espacio de Hilbert, entonces $B(H)$ es una C^* -álgebra. En particular M_n : es una C^* -álgebra.
- 2 $\mathcal{K}(H) \triangleleft B(H)$, C^* -álgebra de los operadores compactos.

Ejemplos

- 1 Si H es un espacio de Hilbert, entonces $B(H)$ es una C^* -álgebra. En particular M_n : es una C^* -álgebra.
- 2 $\mathcal{K}(H) \triangleleft B(H)$, C^* -álgebra de los operadores compactos.
- 3 $B(E)$: operadores acotados en un espacio de Banach.

Ejemplos

- 1 Si H es un espacio de Hilbert, entonces $B(H)$ es una C^* -álgebra. En particular M_n : es una C^* -álgebra.
- 2 $\mathcal{K}(H) \triangleleft B(H)$, C^* -álgebra de los operadores compactos.
- 3 $B(E)$: operadores acotados en un espacio de Banach.
- 4 $C_0(X) := \{a \in C(X) \text{ y } |a|^{-1}[\epsilon, \infty) \text{ es compacto, } \forall \epsilon > 0\}$ es una C^* -álgebra (conmutativa) con la norma del máximo y la conjugación como involución.

Ejemplos

- 1 Si H es un espacio de Hilbert, entonces $B(H)$ es una C^* -álgebra. En particular M_n : es una C^* -álgebra.
- 2 $\mathcal{K}(H) \triangleleft B(H)$, C^* -álgebra de los operadores compactos.
- 3 $B(E)$: operadores acotados en un espacio de Banach.
- 4 $C_0(X) := \{a \in C(X) \text{ y } |a|^{-1}[\epsilon, \infty) \text{ es compacto, } \forall \epsilon > 0\}$ es una C^* -álgebra (conmutativa) con la norma del máximo y la conjugación como involución.
- 5 El álgebra del disco $A(\mathbb{D}) := \text{Hol}(\mathbb{D}) \cap C(\bar{\mathbb{D}})$, con $a^*(z) = \overline{a(\bar{z})}$ y la norma del máximo.

Ejemplos

- 1 Si H es un espacio de Hilbert, entonces $B(H)$ es una C^* -álgebra. En particular M_n : es una C^* -álgebra.
- 2 $\mathcal{K}(H) \triangleleft B(H)$, C^* -álgebra de los operadores compactos.
- 3 $B(E)$: operadores acotados en un espacio de Banach.
- 4 $C_0(X) := \{a \in C(X) \text{ y } |a|^{-1}[\epsilon, \infty) \text{ es compacto, } \forall \epsilon > 0\}$ es una C^* -álgebra (conmutativa) con la norma del máximo y la conjugación como involución.
- 5 El álgebra del disco $A(\mathbb{D}) := \text{Hol}(\mathbb{D}) \cap C(\bar{\mathbb{D}})$, con $a^*(z) = \overline{a(\bar{z})}$ y la norma del máximo.
- 6 El álgebra de Wiener: $\mathcal{W} := \{a \in C(\mathbb{T}) : \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{a}(n)| < \infty\}$.

Ejemplos

- 1 Si H es un espacio de Hilbert, entonces $B(H)$ es una C^* -álgebra. En particular M_n : es una C^* -álgebra.
- 2 $\mathcal{K}(H) \triangleleft B(H)$, C^* -álgebra de los operadores compactos.
- 3 $B(E)$: operadores acotados en un espacio de Banach.
- 4 $C_0(X) := \{a \in C(X) \text{ y } |a|^{-1}[\epsilon, \infty) \text{ es compacto, } \forall \epsilon > 0\}$ es una C^* -álgebra (conmutativa) con la norma del máximo y la conjugación como involución.
- 5 El álgebra del disco $A(\mathbb{D}) := \text{Hol}(\mathbb{D}) \cap C(\bar{\mathbb{D}})$, con $a^*(z) = \overline{a(\bar{z})}$ y la norma del máximo.
- 6 El álgebra de Wiener: $\mathcal{W} := \{a \in C(\mathbb{T}) : \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{a}(n)| < \infty\}$.
- 7 Álgebras de sucesiones: c_0, ℓ^∞

Ejemplos

- ❶ Si H es un espacio de Hilbert, entonces $B(H)$ es una C^* -álgebra. En particular M_n : es una C^* -álgebra.
- ❷ $\mathcal{K}(H) \triangleleft B(H)$, C^* -álgebra de los operadores compactos.
- ❸ $B(E)$: operadores acotados en un espacio de Banach.
- ❹ $C_0(X) := \{a \in C(X) \text{ y } |a|^{-1}[\epsilon, \infty) \text{ es compacto, } \forall \epsilon > 0\}$ es una C^* -álgebra (conmutativa) con la norma del máximo y la conjugación como involución.
- ❺ El álgebra del disco $A(\mathbb{D}) := \text{Hol}(\mathbb{D}) \cap C(\bar{\mathbb{D}})$, con $a^*(z) = \overline{a(\bar{z})}$ y la norma del máximo.
- ❻ El álgebra de Wiener: $\mathcal{W} := \{a \in C(\mathbb{T}) : \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{a}(n)| < \infty\}$.
- ❼ Álgebras de sucesiones: c_0 , ℓ^∞
- ❽ Álgebras asociadas a grupos: $\ell^1(\mathbb{Z})$, $L^1(G)$, $M(G)$.

Homomorfismos

Definición

Un homomorfismo $\phi : A \rightarrow B$ de $()$ -álgebras normadas es un homomorfismo de $(*)$ -álgebras que además es continuo.*

Definición

Un homomorfismo $\phi : A \rightarrow B$ de $()$ -álgebras normadas es un homomorfismo de $(*)$ -álgebras que además es continuo.*

Ejemplos

Definición

Un homomorfismo $\phi : A \rightarrow B$ de $()$ -álgebras normadas es un homomorfismo de $(*)$ -álgebras que además es continuo.*

Ejemplos

- 1 Caracteres: $\delta_x : C_0(X) \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $\delta_x(a) = a(x)$.

Definición

Un homomorfismo $\phi : A \rightarrow B$ de $(*)$ -álgebras normadas es un homomorfismo de $(*)$ -álgebras que además es continuo.

Ejemplos

- 1 Caracteres: $\delta_x : C_0(X) \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $\delta_x(a) = a(x)$.
- 2 Transformada de Fourier: $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{T}) \rightarrow c_0(\mathbb{Z})$ tal que

$$\mathcal{F}(a)(n) = \int_{\mathbb{T}} a(z) z^{-n} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} a(e^{it}) e^{-int} dt, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Definición

Un homomorfismo $\phi : A \rightarrow B$ de $(*)$ -álgebras normadas es un homomorfismo de $(*)$ -álgebras que además es continuo.

Ejemplos

- 1 Caracteres: $\delta_x : C_0(X) \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $\delta_x(a) = a(x)$.
- 2 Transformada de Fourier: $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{T}) \rightarrow c_0(\mathbb{Z})$ tal que

$$\mathcal{F}(a)(n) = \int_{\mathbb{T}} a(z)z^{-n}dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} a(e^{it})e^{-int}dt, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

- 3 Si $\alpha : X \rightarrow Y$ es un homeomorfismo, entonces $a \mapsto a \circ \alpha$ es un isomorfismo $C_0(Y) \rightarrow C_0(X)$.

Definición

Un homomorfismo $\phi : A \rightarrow B$ de $(*)$ -álgebras normadas es un homomorfismo de $(*)$ -álgebras que además es continuo.

Ejemplos

- ❶ Caracteres: $\delta_x : C_0(X) \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $\delta_x(a) = a(x)$.
- ❷ Transformada de Fourier: $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{T}) \rightarrow c_0(\mathbb{Z})$ tal que

$$\mathcal{F}(a)(n) = \int_{\mathbb{T}} a(z) z^{-n} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} a(e^{it}) e^{-int} dt, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

- ❸ Si $\alpha : X \rightarrow Y$ es un homeomorfismo, entonces $a \mapsto a \circ \alpha$ es un isomorfismo $C_0(Y) \rightarrow C_0(X)$.
- ❹ $\phi : \ell^1(\mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} \mathcal{W}$ dada por $(c_n) \mapsto f$, tal que $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n z^n$.

Algunas construcciones

- Productos directos, sumas directas.

Algunas construcciones

- Productos directos, sumas directas.
- Adjunción de la unidad: $A \mapsto \tilde{A} = A \oplus \mathbb{C}$, con:

$$(a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \lambda a + \mu b, \lambda\mu) \text{ y}$$

$$\|(a, \lambda)\| = \|a\| + |\lambda|, \quad (a, \lambda)^* = (a^*, \bar{\lambda})$$

Algunas construcciones

- Productos directos, sumas directas.
- Adjunción de la unidad: $A \mapsto \tilde{A} = A \oplus \mathbb{C}$, con:

$$(a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \lambda a + \mu b, \lambda\mu) \text{ y}$$

$$\|(a, \lambda)\| = \|a\| + |\lambda|, \quad (a, \lambda)^* = (a^*, \bar{\lambda})$$

Algunas construcciones

- Productos directos, sumas directas.
- Adjunción de la unidad: $A \mapsto \tilde{A} = A \oplus \mathbb{C}$, con:

$$(a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \lambda a + \mu b, \lambda\mu) \text{ y}$$

$$\|(a, \lambda)\| = \|a\| + |\lambda|, \quad (a, \lambda)^* = (a^*, \bar{\lambda})$$

Si $\phi : A \rightarrow B$, entonces $\tilde{\phi} : \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ tal que $\tilde{\phi}(a, \lambda) = (\phi(a), \lambda)$

- Productos directos, sumas directas.
- Adjunción de la unidad: $A \mapsto \tilde{A} = A \oplus \mathbb{C}$, con:

$$(a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \lambda a + \mu b, \lambda\mu) \text{ y}$$

$$\|(a, \lambda)\| = \|a\| + |\lambda|, \quad (a, \lambda)^* = (a^*, \bar{\lambda})$$

Si $\phi : A \rightarrow B$, entonces $\tilde{\phi} : \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ tal que $\tilde{\phi}(a, \lambda) = (\phi(a), \lambda)$

- Cocientes A/J . La norma es $\|a + J\| := \inf\{\|a - x\| : x \in J\}$.

Algunas construcciones

- Productos directos, sumas directas.
- Adjunción de la unidad: $A \mapsto \tilde{A} = A \oplus \mathbb{C}$, con:

$$(a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \lambda a + \mu b, \lambda\mu) \text{ y}$$

$$\|(a, \lambda)\| = \|a\| + |\lambda|, \quad (a, \lambda)^* = (a^*, \bar{\lambda})$$

Si $\phi : A \rightarrow B$, entonces $\tilde{\phi} : \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ tal que $\tilde{\phi}(a, \lambda) = (\phi(a), \lambda)$

- Cocientes A/J . La norma es $\|a + J\| := \inf\{\|a - x\| : x \in J\}$.

Definición

Un ideal J de A se llama modular si A/J tiene unidad.

- Productos directos, sumas directas.
- Adjunción de la unidad: $A \mapsto \tilde{A} = A \oplus \mathbb{C}$, con:

$$(a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \lambda a + \mu b, \lambda\mu) \text{ y}$$

$$\|(a, \lambda)\| = \|a\| + |\lambda|, \quad (a, \lambda)^* = (a^*, \bar{\lambda})$$

Si $\phi : A \rightarrow B$, entonces $\tilde{\phi} : \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ tal que $\tilde{\phi}(a, \lambda) = (\phi(a), \lambda)$

- Cocientes A/J . La norma es $\|a + J\| := \inf\{\|a - x\| : x \in J\}$.

Definición

Un ideal J de A se llama modular si A/J tiene unidad.

- Todo ideal modular maximal es un ideal maximal de A .

Teorema

Si A es un álgebra de Banach con unidad, entonces $\text{Inv}(A) := \{a \in A : a \text{ es invertible}\}$ es abierto en A , y es un grupo topológico con la estructura heredada de A .

Teorema

Si A es un álgebra de Banach con unidad, entonces $\text{Inv}(A) := \{a \in A : a \text{ es invertible}\}$ es abierto en A , y es un grupo topológico con la estructura heredada de A .

Demostración.

Si $a \in B(1, 1)$, entonces $a^{-1} = \sum_{n \geq 0} (1 - a)^n$:

$$a \sum_{n \geq 0} (1 - a)^n = \sum_{n \geq 0} (1 - a)^n - (1 - a) \sum_{n \geq 0} (1 - a)^n = 1.$$

Teorema

Si A es un álgebra de Banach con unidad, entonces $\text{Inv}(A) := \{a \in A : a \text{ es invertible}\}$ es abierto en A , y es un grupo topológico con la estructura heredada de A .

Demostración.

Si $a \in B(1, 1)$, entonces $a^{-1} = \sum_{n \geq 0} (1 - a)^n$:

$$a \sum_{n \geq 0} (1 - a)^n = \sum_{n \geq 0} (1 - a)^n - (1 - a) \sum_{n \geq 0} (1 - a)^n = 1.$$

Teorema

Si A es un álgebra de Banach con unidad, entonces $\text{Inv}(A) := \{a \in A : a \text{ es invertible}\}$ es abierto en A , y es un grupo topológico con la estructura heredada de A .

Demostración.

Si $a \in B(1, 1)$, entonces $a^{-1} = \sum_{n \geq 0} (1 - a)^n$:

$$a \sum_{n \geq 0} (1 - a)^n = \sum_{n \geq 0} (1 - a)^n - (1 - a) \sum_{n \geq 0} (1 - a)^n = 1.$$

Ahora si $a \in \text{Inv}(A)$, entonces $B(a, \frac{1}{\|a^{-1}\|}) \subseteq \text{Inv}(A)$, y

$$\|b^{-1} - a^{-1}\| \leq \frac{\|a - b\| \|a^{-1}\|^2}{1 - \|a^{-1}(a - b)\|} \rightarrow 0 \text{ si } b \rightarrow a.$$



Definición (espectro de un elemento)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. El espectro de a en A es:

Definición (espectro de un elemento)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. El espectro de a en A es:

- Si A tiene unidad: $\sigma_A(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} : a - \lambda \notin \text{Inv}(A)\}$.

Definición (espectro de un elemento)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. El espectro de a en A es:

- Si A tiene unidad: $\sigma_A(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} : a - \lambda \notin \text{Inv}(A)\}$.
- Si A no tiene unidad: $\sigma_A(a) := \sigma_{\tilde{A}}(a)$.

Definición (espectro de un elemento)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. El espectro de a en A es:

- Si A tiene unidad: $\sigma_A(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} : a - \lambda \notin \text{Inv}(A)\}$.
- Si A no tiene unidad: $\sigma_A(a) := \sigma_{\tilde{A}}(a)$.
- El conjunto $\rho(a) := \mathbb{C} \setminus \sigma(a)$ se llama conjunto resolvente de a .

Definición (espectro de un elemento)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. El espectro de a en A es:

- Si A tiene unidad: $\sigma_A(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} : a - \lambda \notin \text{Inv}(A)\}$.
- Si A no tiene unidad: $\sigma_A(a) := \sigma_{\tilde{A}}(a)$.
- El conjunto $\rho(a) := \mathbb{C} \setminus \sigma(a)$ se llama conjunto resolvente de a .

Proposición

Sean A un álgebra de Banach con unidad, y $a \in A$.

Definición (espectro de un elemento)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. El espectro de a en A es:

- Si A tiene unidad: $\sigma_A(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} : a - \lambda \notin \text{Inv}(A)\}$.
- Si A no tiene unidad: $\sigma_A(a) := \sigma_{\tilde{A}}(a)$.
- El conjunto $\rho(a) := \mathbb{C} \setminus \sigma(a)$ se llama conjunto resolvente de a .

Proposición

Sean A un álgebra de Banach con unidad, y $a \in A$.

- 1 Si $\phi : A \rightarrow B$ es unital, entonces $\sigma_B(\phi(a)) \subseteq \sigma_A(a)$.

Definición (espectro de un elemento)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. El espectro de a en A es:

- Si A tiene unidad: $\sigma_A(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} : a - \lambda \notin \text{Inv}(A)\}$.
- Si A no tiene unidad: $\sigma_A(a) := \sigma_{\tilde{A}}(a)$.
- El conjunto $\rho(a) := \mathbb{C} \setminus \sigma(a)$ se llama conjunto resolvente de a .

Proposición

Sean A un álgebra de Banach con unidad, y $a \in A$.

- 1 Si $\phi : A \rightarrow B$ es unital, entonces $\sigma_B(\phi(a)) \subseteq \sigma_A(a)$.
- 2 Si $h : A \rightarrow \mathbb{C}$ es un homomorfismo no nulo, entonces $h(a) \in \sigma(a)$.

Definición (espectro de un elemento)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. El espectro de a en A es:

- Si A tiene unidad: $\sigma_A(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} : a - \lambda \notin \text{Inv}(A)\}$.
- Si A no tiene unidad: $\sigma_A(a) := \sigma_{\tilde{A}}(a)$.
- El conjunto $\rho(a) := \mathbb{C} \setminus \sigma(a)$ se llama conjunto resolvente de a .

Proposición

Sean A un álgebra de Banach con unidad, y $a \in A$.

- 1 Si $\phi : A \rightarrow B$ es unital, entonces $\sigma_B(\phi(a)) \subseteq \sigma_A(a)$.
- 2 Si $h : A \rightarrow \mathbb{C}$ es un homomorfismo no nulo, entonces $h(a) \in \sigma(a)$.
- 3 Si $p \in \mathbb{C}[X]$, entonces $\sigma(p(a)) = p(\sigma(a))$.

Proposición

La función resolvente $R_a : \mathbb{C} \setminus \sigma(a) \rightarrow \text{Inv}(A)$, definida como $R_a(z) = (z - a)^{-1}$, es holomorfa, y $\lim_{z \rightarrow \infty} R_a(z) = 0$. Además si $|z| > \|a\|$ se tiene: $R_a(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{z^{n+1}}$.

Proposición

La función resolvente $R_a : \mathbb{C} \setminus \sigma(a) \rightarrow \text{Inv}(A)$, definida como $R_a(z) = (z - a)^{-1}$, es holomorfa, y $\lim_{z \rightarrow \infty} R_a(z) = 0$. Además si $|z| > \|a\|$ se tiene: $R_a(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{z^{n+1}}$.

Teorema (Gelfand)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. Entonces $\sigma(a) \subseteq \bar{D}(0, \|a\|)$, es compacto y no vacío.

Proposición

La función resolvente $R_a : \mathbb{C} \setminus \sigma(a) \rightarrow \text{Inv}(A)$, definida como $R_a(z) = (z - a)^{-1}$, es holomorfa, y $\lim_{z \rightarrow \infty} R_a(z) = 0$. Además si $|z| > \|a\|$ se tiene: $R_a(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{z^{n+1}}$.

Teorema (Gelfand)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. Entonces $\sigma(a) \subseteq \bar{D}(0, \|a\|)$, es compacto y no vacío.

Demostración.



Proposición

La función resolvente $R_a : \mathbb{C} \setminus \sigma(a) \rightarrow \text{Inv}(A)$, definida como $R_a(z) = (z - a)^{-1}$, es holomorfa, y $\lim_{z \rightarrow \infty} R_a(z) = 0$. Además si $|z| > \|a\|$ se tiene: $R_a(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{z^{n+1}}$.

Teorema (Gelfand)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. Entonces $\sigma(a) \subseteq \bar{D}(0, \|a\|)$, es compacto y no vacío.

Demostración.

- 1 Es directo que $\sigma(a)$ es compacto y está contenido en $\bar{D}(0, \|a\|)$.



Proposición

La función resolvente $R_a : \mathbb{C} \setminus \sigma(a) \rightarrow \text{Inv}(A)$, definida como $R_a(z) = (z - a)^{-1}$, es holomorfa, y $\lim_{z \rightarrow \infty} R_a(z) = 0$. Además si $|z| > \|a\|$ se tiene: $R_a(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{z^{n+1}}$.

Teorema (Gelfand)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. Entonces $\sigma(a) \subseteq \bar{D}(0, \|a\|)$, es compacto y no vacío.

Demostración.

- 1 Es directo que $\sigma(a)$ es compacto y está contenido en $\bar{D}(0, \|a\|)$.
- 2 Si fuera $\sigma(a) = \emptyset$, entonces $R_a = 0$ por el teorema de Liouville.



Corolario (Gelfand-Mazur)

Si A es un álgebra normada con división, entonces $A = \mathbb{C} \cdot 1_A$.

Corolario (Gelfand-Mazur)

Si A es un álgebra normada con división, entonces $A = \mathbb{C} \cdot 1_A$.

Definición (radio espectral)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. El radio espectral de a es

$$r(a) := \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\}.$$

Corolario (Gelfand-Mazur)

Si A es un álgebra normada con división, entonces $A = \mathbb{C} \cdot 1_A$.

Definición (radio espectral)

Sean A un álgebra de Banach y $a \in A$. El radio espectral de a es

$$r(a) := \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\}.$$

Ejemplo

El operador de Volterra $V : C([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ tal que

$$V_a(t) = \int_0^t a(s) ds$$

es no nulo, pero $r(V_a) = 0$.

Teorema (Beurling-Gelfand)

Si A es un álgebra de Banach y $a \in A$, entonces

$$r(a) = \inf_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$$

Teorema (Beurling-Gelfand)

Si A es un álgebra de Banach y $a \in A$, entonces

$$r(a) = \inf_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$$

Demostración.



Teorema (Beurling-Gelfand)

Si A es un álgebra de Banach y $a \in A$, entonces

$$r(a) = \inf_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$$

Demostración.

- $\sigma(a^n) = \sigma(a)^n \Rightarrow r(a^n) = r(a)^n \leq \|a^n\| \Rightarrow r(a) \leq \inf_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}}.$



Teorema (Beurling-Gelfand)

Si A es un álgebra de Banach y $a \in A$, entonces

$$r(a) = \inf_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$$

Demostración.

- $\sigma(a^n) = \sigma(a)^n \Rightarrow r(a^n) = r(a)^n \leq \|a^n\| \Rightarrow r(a) \leq \inf \|a^n\|^{\frac{1}{n}}.$
- Si $S_a : D(0, \frac{1}{r(a)}) \rightarrow A$ tal que $S_a(z) = \begin{cases} R_a(\frac{1}{z}) & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases}$, entonces S_a es analítica.



Teorema (Beurling-Gelfand)

Si A es un álgebra de Banach y $a \in A$, entonces

$$r(a) = \inf_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$$

Demostración.

- $\sigma(a^n) = \sigma(a)^n \Rightarrow r(a^n) = r(a)^n \leq \|a^n\| \Rightarrow r(a) \leq \inf \|a^n\|^{\frac{1}{n}}.$
- Si $S_a : D(0, \frac{1}{r(a)}) \rightarrow A$ tal que $S_a(z) = \begin{cases} R_a(\frac{1}{z}) & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases}$, entonces S_a es analítica.
- Entonces $S_a(z) = \sum_{n \geq 0} c_n z^n \quad \forall z / |z| < \frac{1}{\limsup_n \|c_n\|^{1/n}} \Rightarrow$
 $\frac{1}{r(a)} \leq \frac{1}{\limsup_n \|c_n\|^{1/n}}.$



Teorema (Beurling-Gelfand)

Si A es un álgebra de Banach y $a \in A$, entonces

$$r(a) = \inf_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_n \|a^n\|^{\frac{1}{n}}$$

Demostración.

- $\sigma(a^n) = \sigma(a)^n \Rightarrow r(a^n) = r(a)^n \leq \|a^n\| \Rightarrow r(a) \leq \inf \|a^n\|^{\frac{1}{n}}.$
- Si $S_a : D(0, \frac{1}{r(a)}) \rightarrow A$ tal que $S_a(z) = \begin{cases} R_a(\frac{1}{z}) & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases}$, entonces S_a es analítica.
- Entonces $S_a(z) = \sum_{n \geq 0} c_n z^n \quad \forall z / |z| < \frac{1}{\limsup_n \|c_n\|^{1/n}} \Rightarrow \frac{1}{r(a)} \leq \frac{1}{\limsup_n \|c_n\|^{1/n}}.$
- Pero $c_n = a^{n-1}$, $\forall n$, así que $\limsup_n \|c_n\|^{1/n} = r(a).$

